

生産者の皆様へ！テンサイシストセンチュウの侵入・まん延防止対策と早期発見を心がけましょう！

令和8年9月

静岡県、農林水産省名古屋植物防疫所清水支所

本年4月、愛知県で**テンサイシストセンチュウ**の発生が確認されました。

- **侵入・まん延防止**には、**土壌の分散防止**が重要です。
 - **早期発見**が、**効果的な防除**につながります。
 - 適切な対応により防除は可能です。
- 不当な誹謗中傷を防ぐため、冷静な対応をお願いします。

テンサイシストセンチュウ (Hs)

寄主植物	アブラナ属（キャベツ、ブロッコリー等）、ダイコン、ホウレンソウ、トマト等の <u>地下部</u>
被害・生態	・ <u>生育不良</u> 、しおれ等により減収を引き起こす ・ 農機具等に付着したHsを含む <u>土壌の移動等</u> により分散



ブロッコリーの根に寄生する雌成虫

土壌中のシスト
(雌成虫が変化したもの)

Hsによる
坪枯れ状の生育不良

① 侵入・まん延防止対策

- ・ **使用した農機具等**は、移動する前に**必ず土を落としてください**。
- ・ 農機具等を洗浄する場合は、洗浄水が他のほ場へ流出しないよう注意してください。
- ・ **栽培残さ及び収穫残さ**は、**ほ場内にすき込んでください**。
- ・ ほ場での土壌の落とし方の例を、**裏面に記載**したので、確認をお願いします。

裏面もご覧ください

② 早期発見

- ・ キャベツ、ブロッコリー等を生産されている方で、**Hsによる生育不良が疑われる場合は、裏面の連絡先へ連絡**をお願いします。

ほ場での土壌の落とし方（例）



道路に出る前



タイヤに
付着した土壌



ロータリーの爪、サイドチェーン、カバー等にご注意

タイヤやロータリーに付着した土壌は、ほ場内で落としてください。

ロータリーの爪以外にも、サイドチェーンやカバー等に付着している土壌にも注意してください。



土壌を落とす道具(例)

ゴムハンマー、コンバイン鎌、ヘラがあると便利です。

これらを使って、しっかり土を落とします。

可能であれば、その後に硬質ブラシや高圧洗浄機で仕上げるのが望ましいです。

全てほ場内で行ってください!

連絡先

【JA】 JAとぴあ浜松

南営農センター

TEL 0 5 3 - 4 2 5 - 5 9 3 1

浜北営農緑花木センター

TEL 0 5 3 - 5 8 6 - 1 1 1 6

西営農センター

TEL 0 5 3 - 4 8 5 - 2 1 2 7

北営農センター

TEL 0 5 3 - 4 8 5 - 6 2 1 1

湖西集荷場

TEL 0 5 3 - 5 7 9 - 0 0 5 2

【JA】 JA三方原開拓 経済課

TEL 0 5 3 - 4 3 6 - 2 8 8 5

【市】 浜松市 農業振興課

TEL 0 5 3 - 4 5 7 - 2 3 3 1

【市】 湖西市 産業振興課

TEL 0 5 3 - 5 7 6 - 1 2 1 6

【県】 西部農林事務所 地域振興課

TEL 0 5 3 - 4 5 8 - 7 2 1 9

【国】 名古屋植物防疫所 清水支所

TEL 0 5 4 - 3 5 2 - 3 7 7 5